1

~~tumeur extraordinaire dans le ventre~~

No. 29

observation faitte à L'hopital de Vitry Le françois par Louis Duret chirurgien dudit hopital en presence des Medecins et chirurgiens de La même ville Le 14 Xbre 1734 à L'ouverture d'un cadavre d'une fille agée de 32 ans qui portoit depuis neuf années une tumeur qui separée du corps pesoit cent douze livres non compris Le pus et une liqueur Sanieuse qui Sortirent, de L'ouverture qu'on fit de ses differentes partyes, et en La separant de celles aux quels elle etoit attachée il en restoit même environ une livre à L'estomac.

Ce Volume representoit un demy globe irregulier un peu oblong dont La partye Superieure etoit moins large et moins epaisse que l'inferieure, il occupoit touttes Les partyes anterieures, et Laterales du Ventre. apres L'ouverture du peritoine il parut divisé en Sept Lobes par des anfractuositées qui penetroient Jusqu'a Sa partye moienne; les trois Superieurs

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ARC 57 no 89

dont l'un étoit audessous des deux autres qui
étoient plus petits que ceux dedessous, il se
trouva dans le premier du pus une matière
semblable a celle qui se trouve dans Le
Meliceris, les deux autres étoient audessous, l'un
adroitte et l'autre agauche; dans le droit on
remarqua une matière semblable a du suiffe
couleur plombée comme il s'en trouve dans Le
steatome, et le gauche contenoit une substance
plus molace apeu près comme elle paroist
dans L'atherome. les deux suivans que L'on
peut dire moiens dont celuy qui est dans La
partye moyenne du costé gauche étoit
glanduleux et graisseux. ce qui se trouva dans
les deux inferieurs étoit plus solide, et
ressembloit à de La chair de melon qui n'est
pas en parfaitte maturité, touttes ces
matières étoient renfermées dans une double
membranne, mince, transparente, et
solide qui resistoit au scapel comme si
on L'eust mis dans du parchemin; elle étoit
jaune par une substance cellulaire
dont les cellules representoient plusieurs

figures irregulières a peu près spheriques de differentes grosseurs semblables a des oeufs doyes de poulle et de pigeon

Cette tumeur Schireuse couvroit tous les intestins excepté Le foye, et une partye de l'intestin qui formoit un demy cercle sur la partye anterieure, inferieure a deux travers de doigt de son extremité; cet intestin Luy etoit adherant en cet endroit, Le foye etoit horisontalement situé, etant elevé par cette masse qui le colloit pour ainsy dire au diafragme, c'est ce qui donna lieu sans le toucher, d'appercevoir La vesicule du fiel qui contenoit peu de cette Liqueur, tant par rapport a la situation qu'a La pression continuelle de ce volume; il paroist peu d'alteration dans les autres visceres, sinon dans une partye du mesentaire a laquelle ce volume etoit adherant par sa partye superieure et posterieure, on trouva dans cette partye du pus qui sembloit avoir

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Communication avec Lepiploon; ce fut pour
lors quen la separant de ce viscere quil en
sortit beaucoup de pus, ce fut aussy ce qui
fit croire a plusieurs que cetoit un delire au
mesentaire

Je ne trouve dattaches a ce volume que celle
qua naturellement Lepiploon qui nest autre
chose quun saq membranneux et vasculaire
en forme de rezeau parsemé de Nerfs,
de quantité darteres qui forment
plusieurs plexus dune infinité de veines
de glandes, de vaisseaux Limphatiques
et de cellules graisseuses qui par leurs
expension extraordinaire ont donné jour
aux partyes Graisseuses de sy ~~amasser~~
amasser en quantité suffisante pour
produire cet etrange volume

Lepiploon pese ordinairement une demye livre
dans les adultes; mais cela varie suivant La
quantité de La graisse, Verab rapporte quil la
a vü du poidre de cinq livres, Bartolin

La trouvé Marvin, Riolan et d'autres y ont trouvez des ablés, il est sujet à l'hidropisie, Riviere Rapporte quil lui a vû un Schireux de la largeur de quatre doigts qui occupoit tout l'épigastre. Monsieur Moÿen a fait une dissertation sur la petrification d'un Epiploon qui pesoit treize livres neuf onces; mais il ne s'en est pas encore trouvé un de ce volume puisquil occupoit toutes les regions anterieures, et latteralles du ventre depuis le cartilage xiphoide jusqu'au pubis sur huit a neuf poulles d'épaisseur

Quelques jours avant La mort de cette fille je mesuraj son ventre, il avoit de circonference sept pieds un poulle neuf lignes, et de longueur depuis Le cartilage xiphoide jusqu'au pubis trois pieds six poulles quatre Lignes Le tout pied de Roy.

Cette fille depuis L'augmentation de son ventre ne ressentoit aucunne autre incomodité que La pesanteur; il est

surprenant quelle nayt point lui d'oppressión elle a toujour eü bon appetit, et bien fait les fonctions Naturelles, sujette aux Evacuations periodiques qui caracterisent Le sexe, elle sest apperceüe de cette augmentatión apres vne chutte quelle fit sur son dos, cette fille a toujour eté de bonne humeur malgré son incommodité

on peut attribuer La Cause de cet amas prodigieux au relachement des fibres des membrannes de Lepiploon occasioné par La chutte que fit cette fille, et La diversité des matieres plus oü moins epaisse, avec acide plus oü moins exact suivant quil sest trouvé dans ces especes de Lobes

Lepiploon est Le reservoir d'vne graisse qui circule, toutte circulation depend d'vne actión alternative des fluides et des solides qui reagissent sur les fluides ils Contournent Les vns et Les autres au

mouvement, le liquide doit avoir pour
cela un degré Naturel de fluidité, et
le solide une tension proportionnée a
l'action liquide, si donc les fibres sont
plus Lasches qu'ils ne doivent etre Le
liquide perd de son mouvement, il ne
peut en perdre qu'il ne s'ammasse
en plus grande quantité que de toutume
par son repos, il s'altere par son
volume, il devient un poidre aux
partyes qui le contiennent, de maniere
qu'il en survient toujour de Nouveau
qui etend considerablement les partyes
fibreuses qui perdent leur ressort
et qui par consequent sont incapables
d'aider Le mouvement du fluide qui
s'amasse la quantité suffisante pour
produire un volume tel que nous
L'avons dit